

## ■胆道がん 化学療法院内登録レジメン■

(2023.5現在)

療法名	薬剤名	略語	投与量	投与経路・時間	投与日	1コース
GEM療法	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	Day1.8.15	28日
S-1療法	TS-1	S-1	1.25m <sup>2</sup> 未満→80mg/日	内服 1日2回	Day1(夕)~29(朝) (4週間投薬2週間休薬)	42日
			1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満→100mg/日			
			1.5m <sup>2</sup> 以上→120mg/日			
S-1療法	TS-1	S-1	1.25m <sup>2</sup> 未満→80mg/日	内服 1日2回	Day1(夕)~15(朝) (2週間投薬1週間休薬)	21日
			1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満→100mg/日			
			1.5m <sup>2</sup> 以上→120mg/日			
GC療法	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	Day1.8	21日
	シスプラチン	CDDP	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	Day1.8	
GEM+S-1 (80~120mg/日)療法	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	Day1.8	21日
	TS-1	S-1	1.25m <sup>2</sup> 未満→80mg/日	内服 1日2回	Day1(夕)~15(朝) (2週間投薬1週間休薬)	
			1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満→100mg/日			
GCS療法	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	Day1	14日
	シスプラチン	CDDP	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	Day1	
	TS-1	S-1	1.25m <sup>2</sup> 未満→80mg/日	内服 1日2回	Day1(夕)~8(朝) (1週間投薬1週間休薬)	
			1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満→100mg/日			
CDDP+GEM+ Durvalumab療法	1~最大8コース目まで					
	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	Day1.8	21日
	シスプラチン	CDDP	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	Day1.8	
	イミフィンジ	-	1500mg/body(30kg以下は20mg/kg)	点滴静注 1時間	Day1	
	8コース目以降					
	イミフィンジ	-	1500mg/body(30kg以下は20mg/kg)	点滴静注 1時間	Day1	28日